



¿Hay una manera para prevenir la propagación de Pertusis?

Hay una serie de tres inyecciones de vacunas a dos, cuatro y seis meses de edad, seguido por otra inyección entre doce y dieciocho meses de edad. Una vacuna de refuerzo está dado a la edad de cuatro a seis años. Para protección máxima, los niños deben recibir las cinco dosis de la vacuna.

En 2005, una vacuna fue aprobada para los adolescentes y los adultos. Una solo dosis está recomendada para las personas que han completado la serie de vacunas pediátricas recomendadas.

Hay dos vacunas aprobadas para usar: Boostrix está aprobada para las personas 10-18 años de edad; Adacel está aprobada para las personas 11 – 64 años de edad.

¿Hay otras maneras para prevenir Pertusis?

Otras maneras para prevenir la propagación de Pertusis incluye:

- Lavar las manos con jabón y agua caliente.
- Enseñar a los niños a cubrir la boca y la nariz cuando tosen o estornudan y a lavar las manos después.
- No compartir los utensilios de cocina o los vasos.
- Reducir la cantidad de contacto que tiene con alguien que está infectado por Pertusis. Si usted está infectado por Pertusis, reduzca la cantidad de tiempo que pasa con otros.

Origen: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Oklahoma (OSDH)

Recursos Locales

Para información sobre Pertusis, visite nuestro sitio web a:

<http://www.tulsa-health.org/community-health/epidemiology/>

O escriba:

Tulsa Health Department
Planning & Epidemiology
5051 S. 129th E. Ave.
Tulsa, OK 74134

Líneas Telefónicas:
Teléfono: 918/595-4505
Fax: 918/595-4588

Línea Telefónica de THD: 918-595-4500

Para más información sobre la Pertusis, visite:

- El Departamento de Salud de Oklahoma (405) 271-4060
www.health.state.ok.us/program/cdd/infec.html
- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (888) 443-7232
<http://www.cdc.gov/doc.do/id/0900f3ec80228696>

Llame al Departamento de Inmunización a 918-582-9355 para más información sobre la vacunación.



**TULSA HEALTH
DEPARTMENT**

Preparado por Planning & Epidemiology

THD Form 6190.111S (Rev. 5/08)




Pertusis


Desde los 1940's hasta los 1970's, el número de casos de Pertusis bajó en los Estados Unidos debido a la vacunación de los infantes y niños. Desde los 1980's, el índice ha subido, alcanzando cada tres o cuatro años. Esto puede ser debido, en parte, a una mayor conciencia de la enfermedad. En el condado de Tulsa, el número de casos varía; el más reciente punto crítico de 43 casos ocurrió en 2001.

TULSA HEALTH DEPARTMENT

HEALTHY CHOICES. HEALTHY PEOPLE. HEALTHY COMMUNITY.



Pertusis



¿Qué es la Pertusis?

Pertusis, también conocida como la tos ferina, es una infección muy contagiosa causada por la bacteria *Bordetella Pertussis*. El término “tos ferina” ha sido dado a esta infección porque causa la tos severa en ambos niños y adultos. Durante estas rachas de tos, algunas personas hacen un sonido como si trataran de tomar aire que necesitan para respirar.

¿Quién corre el riesgo de contraer la Pertusis?

Pertusis puede ocurrir a cualquier edad; sin embargo, los niños menores de 5 años corren el mayor riesgo de desarrollar síntomas más serios. Estar en contacto íntimo con una persona infectada aumenta el riesgo de infectarse.

¿Cómo se transmite la Pertusis?

La transmisión ocurre por contacto directo con las excreciones de la nariz y boca de una persona infectada.

¿Cuáles son los síntomas?

1 Etapa (Catarral):

- Gripe, escurreniento nasal, y tos irritante
Etapa más infecciosa

2 Etapa (Paroxismal):

- Una serie severa de toses terminando con un chillido.
- El chillido empieza 1 a 2 semanas después de los síntomas de gripe y dura 1 a 2 meses.
- Moco grueso y claro se puede expectorar al fin del ataque de tos
- Los ataques de tos ocurren más frecuentemente en la noche

3 Etapa (Convaleciente):

- La desaparición gradual de los síntomas ocurriendo sobre 2 a 4 semanas, sin embargo, los ataques de tos pueden durar semanas o meses.
- La tos puede sonar más agudo como si fuera empeorando mientras la persona está mejorando.
- La tos puede reaparecer con el gripe o alguna enfermedad respiratoria. Esto no significa que la persona ha sido re-infectada por Pertusis.

Para oír el sonido de un niño con la Pertusis, visite nuestro sitio web a:

<http://www.tulsa-health.org/community-health/epidemiology/?lid=731>

¿Cuándo aparecen los síntomas de la Pertusis?

Los síntomas, si desarrollan, pueden aparecer de 2 a 26 semanas después de la exposición a la bacteria.

¿Cómo se diagnostica la Pertusis?

Se puede sospechar la Pertusis después de 2 semanas de tos continua sin ninguna causa aparente. Los cultivos de la nariz y garganta pueden ser obtenidos para probar para la presencia de la bacteria. Otras pruebas del laboratorio pueden confirmarla.

¿Por cuánto tiempo queda contagiosa una persona infectada por Pertusis?

Sin tratamiento, una persona infectada pueden transmitir la enfermedad desde el tiempo que empieza a toser hasta tres semanas después del comienzo de la tos. Después de cinco días de tratamiento con un antibiótico apropiado, la persona infectada no transmite la enfermedad a otras.

¿Se puede contagiar la Pertusis de nuevo?

Usualmente, una persona que ha tenido la Pertusis no la contagiará de nuevo. Sin embargo, de vez en cuando, una persona puede contraer la Pertusis de nuevo, especialmente si han pasado muchos años.