



## ¿Cómo se previene la Rabia?

- \* Asegúrese que sus mascotas y animales están vacunadas contra la Rabia por un veterinario autorizado. Una vacuna anual y una vacuna para tres años están disponibles.
- \* Guarde los perros en un jardín cercado y los mantenga a raya cuando caminan.
- \* Trate de mantener los gatos en la casa, especialmente durante la noche.
- \* Si su mascota tiene contacto con un murciélago o una mofeta, llame a su veterinario inmediatamente.
- \* No guarde los animales salvajes como mascotas.
- \* Si ve a un animal herido, doméstico o salvaje, no se acerque. Llame a un oficial del control animal, un veterinario, o un grupo de recate para los animales.
- \* Si ve una pelea entre animales, no la interrumpa con las manos o los pies. Use una herramienta, como un rastrillo, o rocíe agua para detener la pelea.
- \* Enseñe a los niños que no deben acercarse a los animales, domésticos o salvajes, que no son familiares.
- \* Disuada a los animales salvajes de acercarse a su casa al: No guardar comida en el jardín, Cerrar los cubos de las basuras, Cerrar las chimeneas, y Mantener las brozas lejos de los edificios.



## Local Resources

Llame a su oficial del control animal para información sobre los mordiscos animales.

### Los números para el control animal en el condado de Tulsa:

Ciudad de Tulsa: (918) 669-6280  
 Ciudad de Bixby: (918) 366-8294  
 Ciudad de Broken Arrow: (918) 259-8311  
 Ciudad de Glenpool: (918) 322-8110  
 Ciudad de Jenks: (918) 299-9511  
 Ciudad de Owasso: (918) 272-4965  
 Ciudad de Sand Springs: (918) 246-2543  
 Ciudad de Sand Springs: (918) 246-2543

Contacte con el Departamento de Salud a:

<http://www.tulsa-health.org/community-health/epidemiology/>

Tulsa Health Department  
 Planning & Epidemiology  
 5051 S. 129th E. Ave.  
 Tulsa, OK 74134  
 Teléfono: 918/595-4505  
 Fax: 918/595-4588

**Línea Telefónica de THD: 918-595-4500**

E-mail: [epidemiology@tulsa-health.org](mailto:epidemiology@tulsa-health.org)

**Para más información sobre la Rabia, visite:**

- \* El Departamento de Salud de Oklahoma (405) 271-4060  
[www.health.state.ok.us/program/cdd/infec.html](http://www.health.state.ok.us/program/cdd/infec.html)
- \* Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (888) 443-7232



**TULSA HEALTH  
DEPARTMENT**

Preparado por Planning & Epidemiology

THD Form 6190.112S (Rev. 5/08)



# La Rabia

La Rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso. La Rabia de los humanos es poco común, pero la Rabia de los animales — especialmente en algunas especies de animales salvajes — es relativamente común. En un año típico, aproximadamente 50-70 casos de la Rabia de los animales son diagnosticados en Oklahoma. Cada 6-8 años, hay un aumento en el número de casos de la Rabia debido a un aumento en la población de las mofetas. Estos años se llaman “años epizooticos” y el número de casos de la Rabia pueden exceder de 200.



Tradicionalmente, los condados de Canadá, Tulsa y Oklahoma tienen la incidencia más alta de la Rabia por los murciélagos, mientras se encuentra la Rabia de las mofetas en todo Oklahoma.

**TULSA HEALTH DEPARTMENT**

HEALTHY CHOICES. HEALTHY PEOPLE. HEALTHY COMMUNITY.

# La Rabia

## ¿Cómo se propaga la Rabia?

Se encuentra la Rabia solamente en el cerebro, la médula espinal, y la saliva de un animal infectado. La transmisión puede ocurrir si cualquier fluido o tejido entra por:

- \* Un mordisco o una herida abierta (que ocurrió menos de 24 horas)
- \* Una membrana mucosa (los ojos, la boca, el interior de la boca, o los genitales)

Los siguientes **NO** transmiten la Rabia:

- \* El contacto con la sangre o la leche
- \* El contacto con la orina o el excremento
- \* El contacto con la saliva seca
- \* Un rasguño de un animal
- \* Acariciar o tocar el pelo de un animal rabioso
- \* Tocar el bol, las correas, verjas, los remolques o otras superficies que tocó el animal rabioso.

## ¿Qué es un mordisco?

Se clasifica un mordisco como provocado o no provocado.

- \* Un mordisco no provocado indica un animal rabioso más frecuentemente que un mordisco provocado.
- \* Un mordisco provocado ocurre cuando una persona crea una situación que amenaza al animal. En estas situaciones, el animal puede morder.

## ¿Cuáles animales contraen la Rabia?

Todos los mamíferos pueden contraer la Rabia. Algunos ejemplos comunes incluyen: Los murciélagos, las mofetas, los mapaches, zorros, perros, gatos, caballos y las vacas. Animales infectados no frecuentes son los roedores (las ardillas, ratas, y los ratones), conejos y liebres, y las zarigüeyas. No hay evidencia que estos animales han transmitido la Rabia a los humanos en los Estados Unidos. Los pájaros, reptiles, (los serpientes, las tortugas y los lagartos) y anfibios (las ranas y sapos), **no** contraen la Rabia.

## ¿Cuáles son los síntomas de la Rabia?

La mayoría de los animales rabiosos no actúan normalmente, pero los síntomas varían. Los animales salvajes que son infectados por la Rabia pueden perder el miedo de los humanos, y los animales nocturnos pueden estar activos durante el día. Los animales rabiosos pueden:

- \* Actuar agitados o enojados
- \* Morder a otros animales, humanos y objetos inanimados
- \* Recluirse
- \* Tambalearse o actuar como si fueran paralizados

## ¿Quién hace la prueba para la Rabia?

La única manera para saber si un animal tiene la Rabia es hacer una prueba en el tejido del cerebro al laboratorio del Departamento de Salud de Oklahoma — el único laboratorio en Oklahoma que hace la prueba para Rabies. El cerebro del animal tiene que ser intacto para la prueba, por eso:

- \* No le pegue un tiro en la cabeza
- No aplaste la cabeza del animal

Si el oficial del control animal no recoge el animal muerto y lo tiene en su posesión, use guantes para recoger el animal y póngalo en una bolsa de basura. Los animales tienen que ser en buena condición; no pueden ser descompuestos. Refrigere el animal muerto hasta que pueda darle a un veterinario o a un oficial del control animal. No lo congele.



**Si el animal que muerde no es un caso rutina, como un animal exótico, o si el perro, gato o hurón no aparece estar saludable, o si un mordisco severo ocurre, o si no se encuentra el animal que muerde dentro de 72 horas, llame al Departamento de Salud de Tulsa.**

## ¿Qué hago si un animal me muerde?

Cuando un animal muerde a alguien, lave inmediatamente la herida con jabón y agua al menos 10 minutos. **Esto puede reducir la transmisión de la Rabia 40%.**

Luego, consulte a su médico porque los antibióticos y una vacuna de tétano pueden ser necesarios.

Si el animal que muerde es un perro, gato o hurón, si el animal aparece estar saludable, y si el mordisco no es severo, siga estas recomendaciones:

- \* **Si el animal ha recibido todas las vacunas recomendadas** (administradas por un veterinario autorizado), el animal estará encerrado y observado en la casa del dueño para 10 días para determinar si exhibe síntomas de la Rabia (excepto en la ciudad de Tulsa).
- \* **Si el animal NO ha recibido todas las vacunaciones recomendadas**, el animal tiene que estar en cuarentena en la oficina del veterinario o en un centro para el control animal para 10 días por determinar si desarrolla los síntomas de la Rabia.
- \* **Si el animal muerde a su dueño**, y el animal está saludable (no importa el estatus de la vacunación), el animal estará encerrado y observado en la casa del dueño para 10 días por determinar si exhibe síntomas de la Rabia (excepto en la ciudad de Tulsa). **Si el animal está callejero o perdido**, el animal tiene que estar en cuarentena en la oficina del veterinario o en un centro para el control animal por 10 días para determinar si desarrolla los síntomas de la Rabia, o tiene que recibir eutanasia para hacer una prueba.
- \* **En cualquiera de las situaciones anteriores, el undécimo día, el animal tiene que ser examinado por un veterinario y tiene que recibir la vacuna contra la Rabia.**

**En la ciudad de Tulsa, los animales que muerden tienen que estar en cuarentena en una oficina de un veterinario o en un centro para el control animal para 10 días.**